

樂生婦幼醫院用藥

藥品名 (英文) : **Augmentin** 457mg/5ml /35ml

藥品名 (中文) : 安滅菌糖漿用粉劑

藥廠名稱 : 荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司

主成分及含量 : Amoxicillin Trihydrate 400mg/5ml
Clavulanate Potassium 57mg/5ml



外觀描述 :

藥品許可證字號 : 衛署藥輸字第 018433 號

適應症 : 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症

用法用量 :

小孩 : <40 公斤，每天每公斤 20-40mg，分 2-3 次服用。

嬰兒 : <3 個月，每天每公斤 30mg，分成 12 小時一次。

禁忌 : 對於本品主成分或任一賦形劑過敏者，禁止使用本藥品。

副作用 : 發燒、皮膚發疹、蕁麻疹等等，

其他注意事項 :

1. 使用前請加冷開水至 35ml，搖勻後使用，未用完部分放冰箱冷藏 (2~8 度 C)，可保存一星期。一星期後如未用完請丟棄，不可再用。
2. Clcr<30ml/min 不建議使用
3. 若於 amoxicillin 治療期間合併使用 allopurinol，會增加發生過敏性皮膚反應的可能性。目前並無 Augmentin 與 allopurinol 併用的資料可供參考。
4. 和其他抗生素相同，Augmentin 可能會影響腸內菌株，造成雌激素再吸收降低並使得口服避孕藥效果下降。

仿單 : <https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=02022447&Seq=028&Type=9>