

# 樂生婦幼醫院用藥

藥品名 (英文) : Cleocin (Lindacin<sup>®</sup>) 150mg/Cap

藥品名 (中文) : 利達信黴素膠囊

藥廠名稱 : 信東生技股份有限公司

主成分及含量 : Clindamycin 150mg



外觀描述 : 紅色/紫色膠囊、標記-ST 023/ST 023

藥品許可證字號 : 衛署藥製 043991 號。

適應症 : 鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌等所引起之感染症。

用法用量 : 口服成人 : 每 6 小時 150~450mg。孩童 : 每天 8~12mg/kg  
分 4 次(嚴重感染每天可高達 25mg/kg)。

禁忌 : 已知對 CLINDAMYCIN 或 LINCOMYCIN 過敏者。

副作用 : 一般來說以胃腸方面的副作用最為常見，包括有腹瀉、食道炎、偽膜性結腸炎等胃腸不適，其他較少見的副作用如血液方面的貧血、白血球減少、血小板降低、肝毒性等。

其他注意事項 : 不要用於治療輕微的細菌或病毒感染。不易進入腦脊髓液，所以不可用於治療腦膜炎。被投與新生兒及嬰兒時，應監視其器官系統之功能。患有嚴重腎病或肝病之病人，使用本藥高劑量時，應監視其血清中濃度。用於孕婦的安全性尚未確立，據報導 clindamycin 出現在乳汁內的濃度範圍是 0.7~3.8ug/ml。

孕婦用藥等級 : **B**

仿單 : <https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=01043991&Seq=001&Type=9>