

# 樂生婦幼醫院用藥

109.04.30 修訂

藥品名(英文)：Acyclovir (Deherp®) 200mg/Tab

藥品名(中文)：庖寧錠 200mg

藥廠名稱：生達化學製藥股份有限公司

主成分及含量：Acyclovir 200mg



外觀描述：

藥品許可證字號：衛署藥製字第 042755 號

適應症：

- (1) 單純庖疹病毒引起之皮膚及粘膜感染。
- (2) 復發性單純?疹感染之抑制。
- (3) 帶狀庖疹病毒引起之感染。
- (4) 預防骨髓移植及白血病所引起之免疫不全病人之單純庖疹感染。
- (5) 水痘之感染。

用法用量：一次 1 錠，一天 5 次，約隔每 4 小時服用 1 次，必須持續治療 5 天。對嚴重之初發性感染，必須延長治療時間。對嚴重腎功能不全的患者，建議劑量為每天 2 次，一次 1 錠，隔約為 12 小時。

禁忌：對 Acyclovir 過敏者。

副作用：有些會頭暈(通常發生在老年人患者)、噁心、嘔吐、腹瀉及腹部疼痛等。少有紅疹。

其他注意事項：

1. 授乳婦需小心使用。
2. Probenecid 會增加 Acyclovir 的血中濃度需小心使用。

孕婦用藥等級：**B**

仿單：<https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=01042755&Seq=002&Type=9>