

樂生婦幼醫院用藥

藥品名(英文)：**Ditropan (Newin®) 5mg/Tab**

藥品名(中文)：尿安錠

藥廠名稱：羅得化學製藥股份有限公司

主成分及含量：Oxybutynin Chloride 5mg



外觀描述：

藥品許可證字號：衛署藥製字第 035467 號

適應症：因膀胱神經之控制不適所伴隨排尿諸症的緩解。

用法用量：成人：一天 2~3 次，一次 5mg。五歲以上之小孩：一天 2 次，一次 2.5~5mg。

禁忌：不適用於患有青光眼、胃腸道阻塞、麻痺性腸塞絞痛、老年人或虛弱的病人所帶有之腸道弛緩、結腸巨大症、潰瘍性結腸炎、重症肌無力、尿道阻塞、心臟血管不適引起的急性出血。

副作用：偶有口乾、出汗減少、尿量停留、視力模糊、心搏加速等現象，請繼續安心服用，數日後這些現象自然會消失。

其他注意事項：

1. 年老之患者、自發性神經患者、肝病、腎臟病等均應小心服用。對潰瘍性結腸炎之病患者給于大量之 Ditropan，也許會發生麻痺性腸塞絞痛或結腸巨大症。
2. 甲狀腺機能亢進者、冠狀動脈心臟病者、充血性心臟衰弱者、心律不整者、心搏過速、血壓過高者、前列腺肥大者，都會因使用本品而加重其症狀。
3. 在高溫度之環境下使用，因為會減少出汗的現象，所以會引起熱疲勞感患者因迴腸造口術或結腸造口術或腸道阻礙而發生之下痢，不適使用本劑。
4. 服用本品可能會引起昏睡、視覺模糊，所以使用期間對於從事冒險工作者、汽車駕駛者等均應特別留神。

孕婦用藥等級：**B**

仿單：<https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=01035467&Seq=005&Type=9>