

樂生婦幼醫院用藥

藥品名 (英文): Exdila 30ml

藥品名 (中文名): 喘解液

藥廠名稱: 晟德大藥廠股份有限公司

主成份及含量: Procaterol 5 MCG/ML (=U)

藥理作用: 本品為第3代的 β_2 作用劑, 具有很高的選擇性, 起始作用迅速, 作用時間長, 而且還有抗過敏的作用, 促進呼吸道纖毛擺動。



外觀描述:

藥品許可證字號: 衛署藥製字第 044482 號

適應症: 支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫等諸疾患之氣道閉塞性障礙。

用法用量:

1天1次, 每次50 μ g 睡前服用, 或1天2次, 早晚各服一次。6歲以上小孩每次25 μ g。未滿6歲者每次1.25 μ g/kg。(1mcg=2 μ g)

禁忌: 孕婦, 心律不整, 心臟阻斷, 狹心症, 狹角青光眼, 休克。

副作用: 心悸, 潮紅, 震顫, 頭痛, 眩暈, 失眠, 耳鳴, 噁心, 皮疹(須停藥), 口渴, 全身倦怠感。

注意事項:

1. 有可能引起心率失常, 服用時應予注意。
2. 以下患者慎服: 甲狀腺機能亢進症、高血壓、心臟病、糖尿病。
3. 孕婦服用應注意: 由於妊娠期服用本藥的安全性尚未得到確立, 所以, 孕婦或處於妊娠期的婦女, 應權衡利弊方可服用。
4. 早產兒、新生兒、乳兒和幼兒服用時注意: 由於早產兒、新生兒、乳兒和幼兒服用的安全性尚未確立, 慎用。

孕婦用藥等級: **D**

仿單: <https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=01044482&Seq=002&Type=9>