

樂生婦幼醫院用藥

藥品名(英文)：Glucophage(Loditon®) 500mg 

藥品名(中文)：伏糖錠

藥廠名稱：生達化學製藥股份有限公司

主成份及含量：Metformin HCL 500mg



外觀描述：白色圓扁型 刻有”STD”“L,09”

藥品許可証字號：衛署藥製字第 043706 號

適應症：糖尿病

用法用量：成人：起始劑量每日三次，每次 500mg，飯中或飯後服用；或每日兩次，每次 850mg，飯中或飯後服用。數日後糖尿病情即可控制，但有時要兩星期以後才能見效。如果病情控制不完全，可增高劑量至每日最高劑量為速效劑型：3000 mg；緩釋劑型：2000mg。

「腎絲球體過濾率（eGFR）介於 30-45 ml/min/1.73 m² 應減量使用」。

- 禁忌：
- 1.腎臟病，及因心血管衰竭，心肌梗塞或敗血症引起的腎功能不良症。
 - 2.在注射放射碘治療過程中，應暫時停止服用本藥，因其會導致腎功能急性轉變。
 - 3.已知本藥會引起過敏反應者。
 - 4.急慢性代謝酸中毒，包含昏迷與否的糖尿病酮酸中毒。
 - 5.腎功能不全患者，腎絲球體過濾率（eGFR）小於 30 ml/min/1.73 m² 禁用

副作用：1.常見-下痢，食慾不振，噁心，嘔吐，腹痛，苦味或金屬味，脹氣，發疹。2.偶有-頭痛，頭昏，不安，疲憊，乳酸中毒。3.長期治療時，每年定期檢查血清 Vitamin B₁₂ 值。

其他注意事項：本藥係由腎臟排泄，所有糖尿病患者均應定期檢查腎功能，特別是年老病患，常伴隨腎功能衰退，服用本藥前後，尤須格外注意監控腎功能變化。

孕婦用藥分級：B

仿單：<http://www.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=01043706&Seq=007&Type=9>