

樂生婦幼醫院用藥


113.10.15 修訂

藥品名 (英文): Panadol(Lactam®) 500mg/Tab

藥品名 (中文名): 利克痛錠

藥廠名稱: 杏輝藥品工業股份有限公司

主成份及含量: Acetaminophen 500mg



外觀描述:

白色橢圓錠，一面刻有 Sinphar 另一面有一刻痕

藥品許可證字號: 衛署藥製字第 022122 號

適應症: 退燒, 止痛(緩解頭痛, 牙痛, 咽喉痛, 關節痛, 神經痛, 肌肉酸痛, 月經痛)

用法用量: 成人: 發燒或需要時服用, 若症狀持續, 則每 4-6 小時可重複服用, 每次 1-2 錠, 初次應使用最小建議劑量, 再視症狀增減用量。每 24 小時內不可超過 4 次。視年齡、症狀適宜增減之。

禁忌: 不得併服含酒精性飲料。

副作用: 長期服用超大劑量會引起肝毒性, 在兒童急性中毒劑量小於 150mg/kg。

其他注意事項:

1. 服用後, 若有發疹, 應停藥並就醫。
2. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示, 3 歲以下不得服用本藥。
3. 曾經因藥物引起過敏症狀者, 使用前必須請教藥師藥劑生或醫師。

孕婦用藥等級: B

仿單: https://mcp.fda.gov.tw/insert/pdfcasefile/i_6f2ecbe3-67b5-45c3-afea-3c80fba96e42