

樂生婦幼醫院用藥

110.07.26 修訂

藥品名(英文)：PGE2 supp (PROSTIN® E2 Vaginal Tablets)

藥品名(中文)：普洛舒定一益二型 陰道錠

藥廠名稱：輝瑞大藥廠股份有限公司

主成分及含量：Dinoprostone 3mg



外觀描述：四角扁形錠劑、印字-UPJOHN,715

藥品許可證字號：衛署藥輸字第 018215 號

適應症：對經產婦或順產婦之引產有效。

用法用量：塞入一錠(3 毫克)至後穹窿，使用後六至八小時如仍無法進行生產，可使用第二顆。在二十四小時之內，最高總投予劑量為 6 毫克，不建議連續使用超過兩天。

副作用：腹瀉、噁心、嘔吐。

其他注意事項：

1. 不應用於對普洛舒定的成分(包括主成分或其他賦形劑)過敏者。
2. 對於有下列情況之病人應禁用普洛舒定及其他催產藥物：
 - (1)多胎妊娠。
 - (2)多胎史(曾有六次或六次以上足月懷孕者)。
 - (3)胎兒頭部尚未進入產位。
 - (4)曾動過子宮手術者(即：剖腹產，子宮切開術)。
 - (5)胎兒頭部及母體骨盆不相稱。
 - (6)疑有或確實證明胎兒窘迫的情形。
 - (7)在產科無論是母體或是胎兒所做的風險評估，仍較適合手術時。
 - (8)懷孕時發生無法解釋的陰道排出液或不正常的子宮出血。
 - (9)非顛頂產式。
3. 儲存於 2~8°C 冰箱內。

懷孕用藥分級：C

仿單：<https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=02018215&Seq=009&Type=9>