

樂生婦幼醫院用藥

109.04.14 修訂

藥品名(英文)：Cal.gluconate (Calglon®)

藥品名(中文)：鈣克康靜脈注射液

藥廠名稱：永豐化學工業股份有限公司

主成份及含量：Calcium Gluconate 10% /10ml /Amp

外觀描述：



藥品許可証字號：內衛藥製字第 005199 號

適應症：骨形成不全、出血、血清病、氣管支氣管氣喘痙攣性因素、皮膚疾患。

用法用量：靜脈注射

成人—每次 10mL，每日或隔日注射一次。

小孩—每次 2~5mL。

對鈣劑過敏、發熱或衰弱之患者，應從 5mL 始用。

禁忌：高血鈣會增加毛地黃毒性，所以毛地黃療法中之患者禁用。

副作用：刺激、皮膚壞死或脫皮、高血鈣。靜脈注射太快，會導致高血鈣症狀、潮紅、末梢血管擴張。

其他注意事項：

1. 本品遇有結晶析出時，應先溫熱使之溶解成澄清狀，方可使用。
2. 本品與酒精混合會析出沉澱，注射器使用酒精消毒時，需待酒精完全揮發後才可使用
3. 飯後 1-2 小時服用，可提高利用率。
4. 定期檢測血、尿、鈣離子濃度。

懷孕安全分級：C