

樂生婦幼醫院用藥

藥品名(英文)：Digoxin



藥品名(中文)：隆我心注射劑

藥廠名稱：葛蘭素史克藥廠

主成份及含量：Digoxin 0.5mg/2ml/amp



外觀描述：

藥品許可証字號：衛署藥製字第 009714 號

適應症：心臟衰竭、心房撲動、心房纖維顫動、陣發性室性心搏過速。

用法用量：

維持劑量：口服/靜注：成人—每天 0.125-0.5mg(平均劑量每天 0.25mg)。小孩—為毛地黃著效劑量的 20%-30%。

注射劑量約為口服劑量的 80%。靜脈投藥為最佳方式。肌肉注射並無優點，反而會引起注射部位疼痛。注射劑不稀釋或以注射用水、生理食鹽水、5%葡萄糖溶液、lactated Ringer's 溶液稀釋 4 倍後，注射時間至少 5 分鐘以上。稀釋倍數不足時會引起沉澱。稀釋後要立即使用。

禁忌：心室纖維顫動、心室搏動過速、毛地黃中毒、壞血性心臟疾病 (beriberi heart disease)、對 digoxin 過敏、某些過敏性頸動脈竇症候群。

副作用：視覺顏色變化,腸胃不適,腹瀉

其他注意事項：

1. 老年人：Digoxin 主要由腎臟排泄，老年人的腎功能衰弱，因此可能需要減少維持劑量。
2. 生體相等性：雖然新上市的藥品應將生體可用率的差異降至最低，但在更換廠牌或使用不同劑型時應特別小心監測臨床反應。
3. 毛地黃中毒症狀包括厭食、噁心、嘔吐、腹瀉或視力紊亂宜小心。

懷孕安全分級：C