

樂生婦幼醫院用藥

藥品名(英文)：(管)*Ketamine(Ketalar[®])50mg/ml/10ml

藥品名(中文)：克太拉注射劑

藥廠名稱：輝瑞大藥廠

主成份及含量：Ketamine 50mg/ml/10ml



外觀描述：

藥品許可証字號：衛署藥製字第 003542 號

適應症：麻醉劑

用法用量：

誘導劑量—1~4.5mg/kg，在 60 秒內 IV 注射或 6.5~13mg/kgIM 注射。
維持劑量—如果須要的話，可增至全誘導劑量的 1.5 倍，隨病人的需要
做適當的調整。

禁忌：血壓上昇且具有危險性的病人，高血壓，動脈瘤，甲狀腺亢進，
鬱血性心衰竭，狹心症和精神病患

副作用：血壓上昇，心跳過快，呼吸刺激。

其他注意事項：

1. 酒精中毒、高血壓、腦脊髓液壓昇高等的病人，以及孕婦在使用本品宜小心
2. 本品要緩慢 IV 注射投與(須超過 1 分鐘)，避免造成過度的呼吸抑制和高血壓，不要 IV 注射濃度為 100mg/ml，也不可以沒有滅菌的水、生理食鹽或葡萄糖溶液稀釋者。
3. 不要將 ketamine 與使用過 barbiturates 的注射器混合，因為會造成化學性的配合禁忌。

懷孕用藥分級：B