

樂生婦幼醫院用藥

藥品名(英文)：**Ovidrel (r-HCG)**

藥品名(中文)：克得諾凍晶注射劑 250mcg

藥廠名稱：Merk

主成份及含量：Choriogonadotropin alfa 250mcg



外觀描述：

藥品許可証字號：衛署菌疫輸字第 000799 號

適應症：

1. 實施人工生殖協助技術(ART)，如體外受精(IVF)的超誘導排卵：投與 OVIDREL 可引起最終濾泡成熟與經刺激成長的濾泡黃體化。2. 無排卵過少婦女的誘導排卵：投與 OVIDREL 可引起刺經刺激濾泡成長的無排卵過少婦女的排卵及黃體化。

用法用量：

1. Ovidrel 以皮下注射使用。注射粉末必須先溶解於所附的溶劑中後立即使用。
2. Ovidrel 需由有治療不孕症問題經驗的醫師使用。
3. 使用劑量：a. 實施人工生殖協助技術(ART)，如體外受精(IVF)的超誘導排卵：當投與最後一劑的 FSH 或 HMG 製劑 24 至 48 小時後，即當濾泡經刺激成長達適當時機時，投與一瓶 250mcg Ovidrel。B. 無排卵或排卵過少婦女的誘導排卵：當濾泡經刺激成長達適當時機 24 至 48 小時後投與一瓶 250mcg Ovidrel。建議患者在使用 Ovidrel 當天及隔天進行性交。

禁忌：a 下視丘或腦下垂體腫瘤。b 對主成份或賦形劑過敏者。c 非多囊性卵巢疾病引起的卵巢增大或囊腫。d 不明原因的生殖器官出血。e 卵巢、子宮或乳房腫瘤。f 三個月內曾發生子宮外孕。f 活動性血栓性插塞。

2. a 原發性卵巢發育不良。b 因生殖器官畸形引起之不孕。c 子宮纖維瘤引起之不孕。d 停經後婦女。

副作用：(1) 皮疹(很少發生)。

(2) 高劑量投藥後，男性患者偶爾會出現鈉水滯留。

其他注意事項：

1. 使用 Ovidrel 後 10 天內會在血液、尿液中測出 hCG，造成假性懷孕的結果
2. 在 Ovidrel 治療過程中，可能有些微的甲狀腺刺激現象，臨床上的相關性並未知。
3. 可儲存在 25 度 C 以下

懷孕安全分級：X