

樂生婦幼醫院用藥

藥品名(英文)：**Piton-S (Oxocin®)**

藥品名(中文)：謳速生注射液

藥廠名稱：大豐製藥股份有限公司

主成份及含量：Oxytocin 10IU(1.66mg)



外觀描述：

藥品許可証字號：衛署藥製字第 033873 號

適應症：分娩誘導、陣痛微弱、子宮內容除去術時之應用、子宮收縮不全。

用法用量：

1. 分娩時之催生或刺激：每 1 IU 加入於 D5W 100ML 施以靜脈滴注。
2. 第三期分娩及產後期：肌肉注射 5~10IU 或緩慢地靜脈注射 5 IU。
3. 剖腹生產：在胎兒產出後，壁內注射 5IU

副作用：過長時間或過速滴注，偶有抗利尿作用，可能產生短暫性水中毒之頭痛、噁心。過量時可能引起下列併發症：胎兒不適。子宮壓力過高，強直性收縮或破水。

禁忌：

胎頭與骨盆不相稱，不正常的產式，子宮過度膨脹，經產超過第四次，高齡經產婦，曾經剖腹生產，或曾經接受過子宮外科手術。嚴重毒血症，先天因素之羊水栓塞，子宮收縮張力過強

注意事項：

1. 以本品引產，必須小心監測(胎兒心跳率，可能時間是陣痛力計及血壓)，因此可視個別反應調整劑量。
2. 有心血管疾病之病人，必須使用濃度較高之容易以維持較少滴注容量。

懷孕用藥分級：**X**