

樂生婦幼醫院用藥

藥品名(英文)：Atracurium 25MG (TRACRIUM[®])




藥品名(中文)：妥開利注射劑

藥廠名稱：荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司

主成份及含量：Atracurium 10MG/ml/2.5ml

外觀描述：



藥品許可証字號：衛署藥輸字第 013148 號

適應症：本藥乃一高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑。可作為手術全身麻醉或加護病房鎮靜時的輔助劑，以鬆弛骨骼肌、幫助氣管插管及與人工呼吸器的協調

用法用量：

1. 本品經由靜脈注射使用。
2. 成人：初劑量：0.3~0.6mg/kg，每次維持劑量可產生15~35分鐘之肌肉鬆弛。維持劑量：0.1~0.2mg/kg，每次維持劑量可產生15~35分鐘之效果。或者以0.005~0.01mg/kg分之速度持續輸注，亦可延長肌肉鬆弛之過程，連續之維持劑量不會引起積蓄作用。

禁忌： 對atracurium、cisatracurium、benzenesulfonic acid 過敏的患者

副作用：

- (1)本品可能引起組織胺的釋放，導致皮膚發紅、短暫低血壓以及極少數支氣管痙攣的報告。
- (2)嚴重的呼吸抑制、急性過敏反應。

其他注意事項：

1. 本品應冷藏於2-8℃
2. 以NS稀釋後可保存24小時，以D5W稀釋後可保存8小時

懷孕用藥分級：C