

樂生婦幼醫院用藥

藥品名(英文)：**Labetalol (Trandate®)**

藥品名(中文)：湍泰低注射液

藥廠名稱：聯亞藥業股份有限公司

主成份及含量：Labetalol 25mg/5ml



外觀描述：

藥品許可証字號：衛署藥製字第 032350 號

適應症：高血壓。

用法用量：

1. 使用一次全劑量注射方式(Bolus injection)時：在必須迅速降低血壓時，應給予靜脈注射50mg之劑量(注射時間至少要1分鐘以上)，且必要時，可每隔5分鐘重複一次直到獲得理想反應為止，惟總劑量不得超過200 mg。通常5分鐘內即可產生最大作用，而作用時間大多約6小時，但有可能長達8小時。
2. 使用靜脈點滴輸注時：應使用1 mg/ml溶液，亦即，將本品8 amp(200mg)稀釋成共200ml含sodium chloride及dextrose BP(或5 % dextrose intravenous infusion BP)之溶液。
3. 妊娠高血壓一開始之點滴輸注劑量為每小時20mg，然後每隔30分鐘給予加倍之劑量直至獲得令人滿意之反應或達到每小時160mg之劑量為止。
4. 伴隨急性心肌梗塞的偶發性高血壓一開始之劑量為每小時15mg，之後依血壓的控制情形逐漸增加至最大劑量為每小時120mg為止。
5. 其他因素引起的高血壓一開始之點滴靜脈輸注率為每分鐘約2mg，直到獲得理想反應後即停止注射。

副作用：

開始服用初期偶有短暫的頭痛、疲倦、眩暈、情緒低落、姿勢性低血壓或昏睡等症狀。極少數患者偶有苔癬樣的紅斑出現，停藥後可消失。

禁忌：

1. 禁忌使用於第二或第三期的心臟傳導阻斷、心臟休克以及其他伴有嚴重及持續低血壓患嚴重心動徐緩狀況的患者。
2. 已知對本劑有過敏反應者。

注意事項：

1. 注射本劑時患者應採仰臥或側左之姿勢。且注射本劑後3小時內患者應避免呈直立姿勢以免造成過度的姿勢性低血壓。
2. 對兒童的安全性及有效性尚未確定。

懷孕用藥分級：C