

# 樂生婦幼醫院用藥

**藥品名(英文)：** Vancomycin for I.V. Injection 500mg

**藥品名(中文)：** 萬古利凡凍晶靜脈注射劑

**藥廠名稱：** 中化裕民健康事業股份有限公司

**主成份及含量：** Vancomycin 500mg



**外觀描述：**

**藥品許可証字號：** 衛署藥製字第 057286 號

**適應症：** 葡萄球菌感染所導致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血病、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎。

**用法用量：**

1. 腎功能正常患者：

成人—通常一日劑量 2 g 靜脈注射，分次投與，可每 6 小時注射 500 mg 或每 12 小時注射 1 g。每次劑量注射速率不超過 10 mg/min。

需作嚴密 vancomycin 血清濃度監視。

2. 腎功能不全患者及老年患者：腎功能不全患者劑量須作調整。

**禁忌：** 腎損傷、聽覺障礙、併用其他的耳毒性或腎毒性藥物

**副作用：** 靜注投與有寒顫、潮紅及發燒現象，口服投與有噁心現象。嚴重者-腎毒性、耳毒性、急性過敏反應。

**其他注意事項：**

1. 所有接受本品的病人要定期做血液研究，尿液分析，肝及腎功能試驗。

2. 儘可能用間歇的靜脈滴注投與。用 10ml 注射用水來稀釋注射用粉，然後加到 100~200ml 的滴注液中，每 6 小時 1 次，注射時間 20~30 分以上。

3. 滴注時要避免外溢，否則會發生嚴重刺激和壞死。

4. 本品與多種藥物不相容，建議獨立管路輸注。

**懷孕用藥分級：** C